


Fauna Ameaçada de Extinção


Aves - 2000



- ANATIDAE**
01 - *Mergus octosetaceus* Vieillot, 1817 - pato-mergulhão - MG, SP, RJ, GO, PR, SC
- TROCHILIDAE**
02 - *Glaucois dohrnii* (Bourcier & Mulsant, 1852) - balança-rabo-canela - BA, ES
03 - *Phaethon superciliosus margaritae* Ruschi, 1972 - besourão-de-rabo-branco - PE, AL, BA, ES
- CAPRIMULGIDAE**
04 - *Caprimulgus candicans* (Pelzelin, 1867) - bacurau-de-rabo-branco - SP, MT, GO
05 - *Eleotrepus anomalus* (Gould, 1838) - curango-do-banhado - RJ ao RS, DF e MG
06 - *Macropsalis forcipata* (Nitzsch, 1840) - bacurau-tesoura-gigante - MG e do ES ao RS
- NYCTIBIDAE**
07 - *Nyctibius leucopterus* (Wied, 1821) - urutau-de-asa-branca - BA e Amazônia
- SCOLOPACIDAE**
08 - *Numenius borealis* (Forster, 1772) - marreco-esquimó - AM, MT, SP
- ARDEIDAE**
09 - *Tigrisoma f. fasciatum* (Such, 1825) - socó-boi-escuro - RJ ao RS, MT e GO
- THRESKIORNITHIDAE**
10 - *Eudicnis ruber* (Linnaeus, 1758) - guará-litoral do AP à SC
- COLUMBIDAE**
11 - *Claravis godefridi* (Temminck, 1811) - pararu, pomba-de-espelho - BA à SC
12 - *Columba cyanopis* (Pelzelin, 1870) - rolinha-do-planalto - MT, GO, SP
- CUCULIDAE**
13 - *Neomorphus geoffroyi dulcis* Sneath, 1927 - aracaju, jacu-molam-bojacu-porco, jacu-verde - MG e ES, ao norte do rio Doce
14 - *Neomorphus g. geoffroyi* (Temminck, 1820) - jacu-estalo, jacu-porco - sul da Região Amazônica (AM, PA, MT, TO) e BA
- ACCIPITRIDAE**
15 - *Accipiter polyostegus* (Temminck, 1824) - anati-pitudo - toda Amazônia e faixa oriental da BA ao RS, incluindo MG, RJ, SP
16 - *Harpia harpyja* (Linnaeus, 1758) - gavião-real, gavião-de-penacho-aíraçu-verdadeiro - Reg. Amazônica, Brasil Central e Leste-Meridional, da BA ao RS
17 - *Harpophaliochus coronatus* (Vieillot, 1817) - águia-cinzenta - Regiões Campestres, como o Pantanal e o Cerrado (BA ao RS)
18 - *Leucopternis lacertulata* (Temminck, 1827) - gavião-pombo - PB à SC
19 - *Leucopternis polioptila* (Kaup, 1847) - gavião-pombo - AL ao RS
20 - *Morphnus guianensis* (Daudin, 1800) - gavião-de-penacho-aíraçu-falso - toda a Amazônia, meridionalmente até o sul de MT e RS
21 - *Spizaster melanoleucus* (Vieillot, 1816) - gavião-pato - Amazônia, Brasil Central e da BA ao RS
- FALCONIDAE**
22 - *Falco diroreutes* Temminck, 1825 - falcão-de-peito-vermelho - Amazônia, Brasil Central, e do PI ao RS
- GALLIFORMES**
23 - *Crax blumenbachii* Spix, 1825 - mutum-do-sudeste - BA, ES, MG, RJ
24 - *Crax fasciolata pinima* Pelzelin, 1870 - mutum-de-penacho - PA, MA
25 - *Mitu mitu* (Linnaeus, 1766) - mutum-do-nordeste - AL, PE
26 - *Penelope jacoucai* Spix, 1825 - jacuaca - PI, CE, PB, PE, AL, BA
27 - *Penelope obscura bronzea* Hellmayr, 1914 - jacuassu, jacuacu - MG e do ES à SC
28 - *Penelope ochrogaster* Pelzelin, 1870 - jacu-de-barriga-castanha - MG, GO, MT
29 - *Pipile jacutinga* (Spix, 1825) - jacutinga - BA ao RS

- PASSERIFORMES**
30 - *Calyptura cristata* (Vieillot, 1818) - tiê-de-coroa - RJ
31 - *Carpornis melanoccephalus* (Wied, 1820) - sabiá-pimenta - AL, BA, ES, RJ, SP, PR
32 - *Colinga maculata* (Muller, 1776) - creio, catinga - BA ao RJ e MG
33 - *Idolopelia pipra* (Lesson, 1831) - anambzinho - PB à SP e MG
34 - *Lipaugus lanioides* (Lesson, 1844) - sabiá-da-mata-virgem - BA e MG à SC
- 35 - *Phibalura flaviviridis* Vieillot, 1816 - desourinha - BA ao RS, MG e GO
36 - *Piprites pileatus* (Temminck, 1822) - canelinho-de-chapéu-preto - MG e do RJ ao RS
37 - *Procnias a. orecanus* (Hermann, 1783) - araponga-do-nordeste, guiraponga - MA, PI, CE, PE, AL, BA
38 - *Pyroderus s. scutatus* (Shaw, 1792) - pava, pavão-do-mato - BA ao RS e GO
39 - *Xiphodena atropurpurea* (Wied, 1820) - anambé-de-asa-branca - PB ao RJ
40 - *Xiphocolaptes falcirostris* (Spix, 1824) - arapaçu-do-nordeste - MA à PB e BA
41 - *Xiphocolaptes falcirostris franciscanus* Sneath, 1927 - arapaçu-do-sul-francisco - MG
- EMBERIZIDAE**
42 - *Amaurospiza moesta* (Hartlaub, 1853) - negrinho-do-mato - MAMG e do RJ ao RS
43 - *Carduelis yarrowii* Audubon, 1839 - pintassilgo-do-nordeste - CE, PE, AL, BA
44 - *Conothraupis mesoleuca* (Berlioz, 1939) - MT
45 - *Dacnis nigripes* Pelzelin, 1856 - sai-de-pernas-pretas - ES, RJ, MG, SP, SC
46 - *Gubernatrix cristata* (Vieillot, 1817) - cardel-amarelo - RS
47 - *Nemota rozei* Cabanis, 1870 - saíra-apanhadora - ES, RJ
48 - *Oryzopsis maximiliani* Cabanis, 1851 - bicudo-verdadeiro, bicudo-preto - Amazônia, Brasil Central e Leste (AL à SP)
49 - *Poospiza cinerea* Bonaparte, 1859 - andorinha-do-oco-do-pau - MT, GO, MG, SP
50 - *Sporophila falcirostris* (Temminck, 1820) - papa-capim, cigarras-verdadeiras - BA, ES, MG, RJ, SP, PR
51 - *Sporophila frontalis* (Verreaux, 1869) - picócho, papa-arroz - BA, ES, MG e do RJ ao RS
52 - *Sporophila palustris* (Barrows, 1883) - caboclinho-do-papo-branco - MS, GO e de MG ao RS
53 - *Tangara fastosa* (Lesson, 1831) - pintor-verdadeiro - RN, PB, PE, AL
- FORMICARIIDAE**
54 - *Cercemonia carbonaria* Sclater & Salvin, 1873 - RR
55 - *Dysithamnus plumbeus* (Wied, 1831) - BA, MG, ES, RJ
56 - *Formicivora erythronotos* Hartlaub, 1852 - formigueiro-de-cabeça-negra - RJ
57 - *Formicivora itheringi* Hellmayr, 1909 - formigueiro-do-nordeste - BA, MG
58 - *Herpilotichus pectoralis* Sclater, 1857 - MA, RN, SE, BA
59 - *Myiarcha ruficauda* (Wied, 1831) - ES à PE e PB
60 - *Myiarcha s. minor* Salvadori, 1864 - choquinha - ES e de MG à SP
61 - *Myiarcha minor* Salvadori, 1864 - choquinha - ES e de MG à SP
62 - *Priglena atra* (Swainson, 1825) - papa-formigas, papa-toca-da-bahia - BA, SE
63 - *Rhoportus ardesiaca* (Wied, 1831) - papa-formigas-de-gravata - BA
64 - *Symphylorhynchus acutirostris* Bornschein, Reinel & Teixeira, 1995 - bicudinho-do-brejo - PR
65 - *Terenura sicli* Teixeira & Gonzaga, 1983 - zidê-dê-do-nordeste - PE, AL

Fontes: Bernardes, A. T., Machado, A. B. M., Rylands, A. B. Fauna brasileira ameaçada de extinção. Belo Horizonte: Biodiversitas, 1990; Brasil. IBAMA. Portaria n. 1522, de 19 de dezembro de 1989. Lista oficial de espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção. Diário Oficial (da República Federativa do Brasil). Brasília, DF, p. 24156-24159, 22 dez. 1989. Seção 1: Fauna ameaçada de extinção. Escala 1: 5 000 000. Projeção policônica. Rio de Janeiro: IBGE, 1992. SICK, H. Ornithologia brasileira: uma introdução. Brasília: UnB, 1986. v. 1 e 2.



- Vegetação Primitiva
Área Antropizada

- FURNARIIDAE**
66 - *Clibanornis dendrocolaptes* (Pelzelin, 1859) - SP, PR, SC, RS
67 - *Megascops paraguayae* Reiser, 1905 - bico-virado-da-catinga - PI, CE, PE, BA, DF, MG
68 - *Phylloscopus novaei* Teixeira & Gonzaga, 1983 - AL
69 - *Poecetes kollari* (Pelzelin, 1856) - RR
70 - *Synalaxis infusca* Pinto, 1950 - PE, AL
71 - *Troglodytes macroura* (Wied, 1821) - rabo-amarelo - BA, ES, RJ, MG
- ICTERIDAE**
72 - *Cercus forbesi* (Sclater, 1886) - anamará, pássaro-de-arroz - PE, AL, MG
73 - *Sturnella defilippii* (Bonaparte, 1850) - peito-vermelho-grande - PR, SC, RS
74 - *Xanthops flavus* (Gmelin, 1788) - pássaro-preto-de-veste-amarela - SC, RS
- MOTACILLIDAE**
75 - *Anthus nattereri* Sclater, 1878 - caminheiro-grande - MG e de SP ao RS
- RHINOCYTIDAE**
76 - *Melospiza roseiventris* Sick, 1958 - enfado-baiano - BA
77 - *Scytalopus novaei* Sick, 1958 - tapaculo-de-brasil - MG, DF, GO
- TURDIDAE**
78 - *Cliophaps l. leucogenys* Cabanis, 1851 - sabiá-castanho - BA, ES
- TYRIDAE**
79 - *Alcedo risora* (Vieillot, 1824) - galito, tesoura-do-campo - MT, SP, RS
80 - *Calocitta caudata* (Vieillot, 1818) - papa-moscas-do-campo - MA, BA, MG, DF, GO, MT, SP, PR
81 - *Hemirhamphus fuscus* (Lafresque, 1846) - papa-moscas-estrela - BA, RJ, SP
82 - *Hemirhamphus nanus* (Todd, 1925) - Amazônia (PA)
83 - *Phylloscopus collybita* (Temminck, 1820) - cana-pintada - AL
84 - *Phylloscopus roqueti* Sneath, 1928 - cana-dourada - MG
85 - *Phylloscopus leucopus* Wied, 1831 - patinho-gigante - ES ao RS
- PHOENICOPTERIDAE**
86 - *Phoenicopus ruber* Linnaeus, 1758 - ganso-do-norte, ganso-cor-de-rosa, flamingo - AP, PA, MA
- PICIFORMES**
87 - *Jacamaralcyon tridactyla* (Vieillot, 1817) - cutelão, bicudo - ES ao PR e MG
- PICIDAE**
88 - *Campephilus robustus* (Lichtenstein, 1819) - pica-pau-rei - GO, MG e da BA ao RS
89 - *Celex torquatus innuaculus* (Wagler, 1829) - pica-pau-de-coleira - BA, ES
90 - *Dryocopus galeatus* (Temminck, 1820) - pica-pau-de-cara-amarela - SP à PB
91 - *Tricaria malachitica* (Spix, 1824) - sabiá-cica, araquaiava - BA, e de MG ao RS
- PSITTACIFORMES**
92 - *Amazona brasiliensis* (Linnaeus, 1766) - papagaio-da-cara-roxa, chuiá - SP, PR
93 - *Amazona pretrei* (Temminck, 1830) - chdião, papagaio-da-serra - SP ao RS
94 - *Amazona droocholophy* (Salvadori, 1890) - chuiá-verdadeiro, jauá, camutanga - AL ao norte extremo de SP e MG
95 - *Amazona vinacea* (Kuhl, 1820) - papagaio-de-peito-roxo, papagaio-caboclo - BA ao RS
96 - *Andorhynchus glaucus* (Vieillot, 1816) (*) - arara-azul-pequena - PR, SC, RS
97 - *Andorhynchus hyacinthinus* (Latham, 1790) - arara-azul-grande, ararauna - MA, PA, AP, BA, MG, MT, MS, GO, TO
98 - *Andorhynchus leari* Bonaparte, 1856 - arara-azul-de-Lear - BA
99 - *Cyanopitta stuarti* (Wagler, 1832) - ararinha-azul - BA
100 - *Guaruba guarouba* (Gmelin, 1788) - guaruba, ararajuba - MA ao PA
101 - *Pyrurus cruentatus* (Wied, 1820) - siriba, furu-mato - BA ao RJ e MG
102 - *Pyrurus leucotis* (Kuhl, 1820) - furu-mato, triba-de-orella-branca - CE, PE, AL, BA, ES, MG, GO, TO
103 - *Touit melanotus* (Wied, 1820) - apum-de-cauda-vermelha - BA, ES, RJ, SP
104 - *Touit surda* (Kuhl, 1820) - apum-de-cauda-amarela - PB à SP
105 - *Tricaria malachitica* (Spix, 1824) - sabiá-cica, araquaiava - BA, e de MG ao RS
- TINAMIDAE**
106 - *Cryptellus noctivagus* (Wied, 1820) - jaú-do-sul, zabelê - alto rio São Francisco - MG ao PI, incluindo PE, BA, ES, e do RJ ao RS
107 - *Nidula minor* (Spix, 1825) - codorna-nineira, codorna-buraqueira - MT, MS, GO, DF, MG, SP
108 - *Tinamus s. minor* (Temminck, 1815) - inhambu-carape - MS, GO, DF, MG, SP, PR
109 - *Tinamus s. minor* (Temminck, 1815) - macuco - MG, GO, MT e de PE ao RS
- TINAMIFORMES**
110 - *Tinamus s. minor* (Temminck, 1815) - macuco - MG, GO, MT e de PE ao RS
- (*) Espécies provavelmente extintas
- NOTA: Na legenda, as espécies se encontram identificadas pela classe, ordem e família a que pertencem e também pelo seu nome científico, nome popular e distribuição geográfica. No mapa, essas espécies se encontram localizadas alternativamente dentro de sua área de ocorrência, estão numeradas conforme a figura que representa suas respectivas famílias.